

# **BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO**

N.7 del 30/08/2024

valido per le province di Perugia e Terni




**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## **FOCUS SETTIMANALE**

**Le catture degli adulti risultano ancora molto contenute, è comunque opportuno fare il campione di n.100 drupe per poter verificare la presenza di uova e larve.**

**Al momento non sono necessari interventi adulticidi.**



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III D.Lgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.7 del 30/08/2024

valido per le province di Perugia e Terni




# SFR Umbria


Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## ANDAMENTO METEOROLOGICO

**Tendenza:** Ancora bel tempo domenica, progressivo peggioramento ad inizio della prossima settimana. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale del Lago Trasimeno



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale della Media Valle del Tevere

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO


N.7 del 30/08/2024

valido per le province di Perugia e Terni



# SFR Umbria

Servizio  
Fitosanitario  
Regionale




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

## FASE FENOLOGICA

### ***Ingrossamento dei frutti - 2° stadio***

*Le drupe raggiungono quasi le dimensioni definitive. (BBCH 79)*



# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.7 del 30/08/2024

valido per le province di Perugia e Terni



**SFR**  
**Umbria**

Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## MONITORAGGIO PATOGENI

### MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*

### STRATEGIE DI DIFESA

**Le catture di adulti risultano molto limitate e stabili rispetto alla scorsa settimana, soprattutto nei Comuni di Guardea, Lugnano in Teverina, Orvieto, Spello, Spoleto.**

Considerato lo stadio della fase fenologica, si consiglia di fare il campione di n.100 drupe per poter verificare la presenza di uova e larve.

Si consiglia di adottare strategie adulticide per abbattere la popolazione di individui adulti e ridurre la presenza.

L'utilizzo di prodotti repellenti quali **Caolino o Zeolite** ha un'azione utile a dissuadere l'insetto ad ovideporre.

**Si ricorda che i trattamenti curativi possono essere effettuati solo al superamento della soglia di infestazione attiva (4-5%),** secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di Difesa Integrata della Regione

**L'infestazione attiva è rappresentata dalla somma degli stadi larvali.**




Foto Edagricole

# **BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO**

N.7 del 30/08/2024

valido per le province di Perugia e Terni



**SFR**  
**Umbria**

**Servizio  
Fitosanitario  
Regionale**

## **UTILIZZO DEL RAME**

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell' arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame". L'utilizzo di fertilizzanti a base di rame, in assenza di documenti che dimostrino all'Organismo di Controllo la carenza nutrizionale.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2023/2024, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>